

IgA casein og gliadin Rapport



PASIENTNAVN
Donald Duck

FØDSELSDATO
26.09.2010

RID
39090000


PRØVETAKINGSDATO
DATO

14.03.2016
14.03.2016


Resultater

● - ditt resultat

IgA casein: 11.0 U/mL



IgA gliadin: 13.0 U/mL



Hva er IgA gliadin og casein?

IgA antistoff dannes av immunapparatet som følge av en immunrespons mot antigener/proteiner i slimhinner, for eksempel i mage-tarm slimhinnen.

IgA gliadin er antistoff som dannes for å beskytte slimhinner mot proteinet gluten/gliadin.

IgA casein er antistoff som dannes for å beskytte slimhinner mot melkeprotein.



Tolkning

Generell informasjon:

Metoden er basert på ELISA og resultatene oppgis i U/mL. Normalområdet er mindre enn (<) 8,0 U/mL, gråsone positiv er fra 8,0-12,0 U/mL. Positiv /forhøyet IgA er fra 12,0 U/mL og oppover.

IgA gliadin (AGA) kan være positiv/forhøyet ved glutenintoleranse og sekundært ved inflammatoriske tarmlidelser med økt slimhinnepermeabilitet. Ved positiv/forhøyet IgA gliadin, kan det være aktuelt å undersøke videre med hensyn på cøliaki med måling av IgA transglutaminase og IgG deamidert gliadin.

Eliminasjon av glutenholdige matvarer kan være aktuelt å forsøke. Testresultatet kan ikke benyttes til å stille diagnoser.

IgA casein kan være positiv/forhøyet ved melkeproteinintoleranse og sekundært ved inflammatoriske tarmlidelser med økt slimhinnepermeabilitet. Eliminering av matvarer som inneholder melkeprotein kan være aktuelt å forsøke. Testresultatet kan ikke benyttes til å stille diagnoser.

Ved eliminering av mat, er det viktig å tilføre ekstra med vitaminer, mineraler og fettsyrer for å hindre ernæringsmangler.

Validering og tolkning:

D Tveiten, laboratoriesjef Lab1

Dr. KL Reichelt, (PhD)